Galassie e lenti gravitazionali

Crescenzo Tortora

Glossario

Velocità della luce:

300 000 km/s (nel vuoto)

Anno luce:

Distanza percorsa dalla luce in 1 anno
(la luce del Sole arriva in poco più di 8 minuti)

Massa solare:

2×10^{30} kg (valore usato come riferimento)

Secondo d'arco:

3600esima parte del grado
(la Luna si estende per circa mezzo grado)

Giochiamo

M51 (Galassia Vortice)

1

**Come la racconterei
a chi non l'ha vista?**

2

**Che cosa mi incuriosisce
e cercherei di scoprire?**

Telescopio Spaziale Hubble

**Come sono fatte
le galassie?**

Da cosa sono composte?

Stelle

Ammassi di stelle

Gas interstellare

Polveri

Materia Oscura

Forma/struttura

Galassia a Spirale

Galassia a spirale barrata

Galassia ellittica

Galassia irregolare

Dimensioni:

~ 10000-100000 anni luce

Massa:

~ 1 milione a 1000 miliardi
la massa del Sole

Velocità stelle:

Centinaia di km al secondo

Luce: luminosità e colore - 1

Luce: luminosità e colore - 2

Stelle blu: più giovani

Stelle rosse: più vecchie

Luce: luminosità e colore - 2

Stelle blu: più giovani

Stelle rosse: più vecchie

Luce: luminosità e colore - 2

Stelle blu: più giovani

Stelle rosse: più vecchie

Luce: luminosità e colore - 2

Stelle blu: più giovani

Stelle rosse: più vecchie

E ci sono molte più stelle nelle parti centrali, e la densità diminuisce andando verso l'esterno

...ma c'è anche il gas che emette luce, come vedremo dopo

Distanza

Alpha Centauri ~ 4.4 a. l.

Galassia di Andromeda ~ 2.5 milioni di a.l.

Ammasso della Vergine ~ 65 milioni di a.l.

Galassia Vortice ~ 23 milioni di a.l.

GN-z11 ~ 13.5 miliardi di a.l.

E' isolata o in compagnia?

Dimensioni:

~5-10 milioni di a.l.

Massa:

~ 1 milione di miliardi la massa del Sole

Velocità galassie:

Fino a 1000 km al secondo

Interazioni con altre galassie

Come osserviamo le galassie?

Tanti ingredienti

- Diametro dello specchio primario del telescopio e ottiche
- Elettronica
- Sensore di rilevamento, CCD (scala di pixel)
- Strumenti: immagini (filtri), spettroscopia (spettrografo)
- Lunghezze d'onda
- Campo di vista
- Luogo dove si trova il telescopio (seeing atmosferico)
- Se dedicato a survey specifiche o aperto alla comunità
- ecc. ecc.

Come otteniamo le immagini?

Come otteniamo le immagini?

Come otteniamo le immagini?

Come otteniamo le immagini?

Modello rgb

Credits: Eraldo Pereira Marinho

Trova le differenze nei colori

C'è qualcosa che manca

Ad una lunghezza d'onda di ~656 nm (nel rosso) l'idrogeno ionizzato (nelle nubi di gas) emette molta più luce che alle lunghezze d'onda adiacenti (**riga di emissione, spettro**)

Filtro $H\alpha$ che seleziona solo questa frequenza

Whirlpool Galaxy M51
HST ACS/WFC

F658N H α [N II]
F814W I
F555W V
F435W B

Whirlpool Galaxy M51
HST ACS/WFC

F658N H α [N II]
F814W I
F555W V
F435W B

25,000 light years
8 kiloparsecs 2'51"

Whirlpool Galaxy M51
HST ACS/WFC

25,000 light years
8 kiloparsecs 2'51"

F658N H α [N II]
F814W I
F555W V
F435W B

***Ciò che vediamo va sempre
interpretato con cura!***

**Quanto è grande il telescopio
e per quanto tempo osserviamo?**

Quanto è grande il telescopio e per quanto tempo osserviamo?

Attivi

INT: 2.54m (Canarie, Spagna)
TNG: 3.58m (Canarie , Spagna)
WHT: 4.2m (Canarie , Spagna)
LBT: 2 x 8.4m (Arizona, US)
VST: 2.6m (Cerro Paranal, Cile)
VLT: 8.2m (Cerro Paranal, Cile)

HST: 2.4m (spazio)
Euclid: 1.2m (spazio)
JWST: 6.5m (spazio)

Futuro

Rubin: 8.4m (Cile)
ELT: 39m (Cile)
Roman: 2.4m (spazio)

Quanti pixel ha la camera?

Quanti pixel ha la camera?

Quanti pixel ha la camera?

Quanti pixel ha la camera?

Quanti pixel ha la camera?

Esposizione fotografica

Esposizione fotografica

<https://www.reddit.com/r/Astronomy/>

Minore esposizione

Maggiore esposizione

E l'atmosfera?

Rifrazione

Dipende dalle condizioni di temperatura
e densità del luogo dove si trova il telescopio

<http://www.astrofototecnica.it>

E l'atmosfera?

Rifrazione

Dipende dalle condizioni di temperatura
e densità del luogo dove si trova il telescopio

<http://www.astrofototecnica.it>

E l'atmosfera?

Rifrazione

Ecco perché le stelle scintillano!

Dipende dalle condizioni di temperatura
e densità del luogo dove si trova il telescopio

<http://www.astrofototecnica.it>

E l'atmosfera?

Rifrazione

Ecco perché le stelle scintillano!

Dipende dalle condizioni di temperatura
e densità del luogo dove si trova il telescopio

<http://www.astrofototecnica.it>

E l'atmosfera?

Rifrazione

Ecco perché le stelle scintillano!

Dipende dalle condizioni di temperatura e densità del luogo dove si trova il telescopio

<http://www.astrofototecnica.it>

Riassumendo

Le galassie

- Sono fatte di stelle, gas, polvere e materia oscura
- Ci sono più stelle nelle regioni centrali
- Hanno forma, luminosità, colore e massa diverse e si trovano a varie distanze
- Sono sorrette dall'equilibrio tra gravità e moti stellari: le stelle possono muoversi lungo orbite quasi circolari o muoversi caoticamente
- Possono essere isolate o vivere vicino ad altre galassie
- Si scontrano e si fondono con altre galassie

Metodo di osservazione: immagini di galassie

- Proprietà del telescopio, ad esempio il diametro
- Filtri per osservare in una specifica frequenza
- Tempi di esposizione
- Numero e dimensione dei pixel della camera (influenza la risoluzione)
- Seeing atmosferico (influenza la risoluzione)

Giochiamo ancora

SDSS (telescopio da Terra)
banda rossa (r)
pixel = 0.4 secondi d'arco
seeing = 1.3 secondi d'arco

Dimensione pixel e seeing

KiDS (telescopio da Terra)
banda rossa (r)
pixel = 0.2 secondi d'arco
seeing = 0.7 secondi d'arco

Vediamo un arco in basso, coloriamo l'immagine

**KiDS (telescopio da Terra),
combinazione delle bande g (green), r (arancione), i (rosso)**

Miglioriamo ancora pixel e seeing

Telescopio Spaziale Hubble

Attraverso altre osservazioni abbiamo scoperto che quegli archi sono più distanti della galassia al centro

Abbiamo scoperto una lente gravitazionale

SLACS: The Sloan Lens ACS Survey

www.SLACS.org

A. Bolton (U. Hawaii IFA), L. Koopmans (Kapteyn), T. Treu (UCSB), R. Covazzi (MP Paris), L. Maistruk (JPL/Caltech), S. Barles (MIT)

Image credit: A. Bolton, for the SLACS team and NASA/ESA

**Cosa sono le lenti
gravitazionali?**

Relatività Generale

Posizione reale

Posizione osservata

La curvatura dello spazio-tempo deforma i percorsi della luce

Facciamo un'analogia

Facciamo un'analogia

SLACS: The Sloan Lens ACS Survey

www.SLACS.org

A. Bolton (U. Hawai'i IFA), L. Koopmans (Kapteyn), T. Treu (UCSB), R. Gavazzi (MP Paris), L. Mauskos (JPL/Caltech), S. Burles (MIT)

Image credit: A. Bolton for the SLACS team and NASA/ESA

Vi ricordate del seeing atmosferico?

M. Walmsley, Strong Lensing Discovery Engine, ESLAB 2025

Images from Legacy Survey (North, BASS/MzLS)

Vi ricordate del seeing atmosferico?

M. Walmsley, Strong Lensing Discovery Engine, ESLAB 2025

Images from Euclid Deep Field North

**Perché sono importanti le
lenti gravitazionali?**

Orologio cosmico

Orologio cosmico

Telescopio cosmico

Orologio cosmico

Telescopio cosmico

Bilancia cosmica

La stima di massa più precisa nell'Universo

La stima di massa più precisa nell'Universo

Raggio di Einstein (θ_E)

La stima di massa più precisa nell'Universo

Raggio di Einstein (θ_E)

$$\theta_E = \sqrt{\frac{D_{LS}}{D_S D_L} \frac{4GM}{c^2}}$$

La stima di massa più precisa nell'Universo

Raggio di Einstein (θ_E)

Massa della lente

$$\theta_E = \sqrt{\frac{D_{LS}}{D_S D_L} \frac{4GM}{c^2}}$$

La stima di massa più precisa nell'Universo

Raggio di Einstein (θ_E)

Distanze tra lente e sorgente D_{LS} ,
dalla sorgente D_S ,
dalla lente D_L

Massa della lente

$$\theta_E = \sqrt{\frac{D_{LS}}{D_S D_L} \frac{4GM}{c^2}}$$

La stima di massa più precisa nell'Universo

Raggio di Einstein (θ_E)

Distanze tra lente e sorgente D_{LS} ,
dalla sorgente D_S ,
dalla lente D_L

Massa della lente

$$\theta_E = \sqrt{\frac{D_{LS}}{D_S D_L} \frac{4GM}{c^2}}$$

$$M(\theta_E) \propto \theta_E^2$$

Telescopio Spaziale Hubble

Attraverso altre osservazioni abbiamo scoperto che quegli archi sono più **distanti della galassia al centro**

Telescopio Spaziale Hubble

Hubble

Ma come misuriamo le distanze di lente e sorgente?

Attraverso altre osservazioni abbiamo scoperto che quegli archi sono più **distanti della galassia al centro**

Telescopio Spaziale Hubble

Hubble

**Ma come misuriamo le distanze
di lente e sorgente?**

Misurando gli spettri e i redshift

**In astronomia, uno spettro
non è un fantasma**

Scomponiamo ancora di più di quanto fatto con i filtri

Vari tipi di spettri

Credit: NASA, ESA, Leah Hustak (STScI)/Tortora&Leccia

Fonte di luce
continua

luce

Spettro continuo

Vari tipi di spettri

Credit: NASA, ESA, Leah Hustak (STScI)/Tortora&Leccia

Fonte di luce continua

Gas

luce

Spettro continuo

Spettro di emissione

Lunghezza d'onda

Lunghezza d'onda

Vari tipi di spettri

Credit: NASA, ESA, Leah Hustak (STScI)/Tortora&Leccia

Fonte di luce continua

Gas

luce

Spettro continuo

Spettro di emissione

Spettro di assorbimento

Lo spettro del sole

Sun's Spectrum vs. Thermal Radiator
of a single temperature $T = 5777 \text{ K}$

Lo spettro delle galassie

**Redshift: spostamento
verso il rosso**

Effetto Doppler

$$z = \frac{\lambda_{\text{osservata}} - \lambda_{\text{emessa}}}{\lambda_{\text{emessa}}}$$

$$v \approx z \cdot c$$

bassi z

Effetto Doppler

$$z = \frac{\lambda_{\text{osservata}} - \lambda_{\text{emessa}}}{\lambda_{\text{emessa}}}$$

$$v \approx z \cdot c$$

bassi z

Come riferimento si usa una lampada per la quale sappiamo dove sono le righe

Effetto Doppler

$$z = \frac{\lambda_{\text{osservata}} - \lambda_{\text{emessa}}}{\lambda_{\text{emessa}}}$$

$$v \approx z \cdot c$$

bassi z

Come riferimento si usa una lampada per la quale sappiamo dove sono le righe

**Conoscendo il redshift
otteniamo la distanza,
vediamo perché!**

L'universo si sta espandendo

La Relatività Generale è la teoria che ci ha permesso di descrivere l'evoluzione dell'Universo

Velocità vs distanza

$$v = HR$$

Where

R = distance

v = velocity

H = Hubble Constant

Distanza

Velocità (determinata attraverso il redshift)

NGC 5866 - 44 mly

NGC 2841 46 mly

NGC 3949 50 mly

NGC 4013 50 mly

NGC 4522 60 mly

NGC 4414 62 mly

NGC 3982 68 mly

NGC 5584 72 mly

NGC 4319 80 mly

NGC 3021 92

NGC 3370 - 98

NGC 1309 - 100 mly

Cepheid & Supernova combinations

Key Project on Extragalactic Distance Scales

<https://cosmosatyourdoorstep.com/2023/03/31/what-is-the-hubble-law/>

Quindi, se misuriamo il redshift conosciamo la distanza della galassia!!!

Questa è una relazione che vediamo sperimentalmente e attraverso la Relatività Generale di Einstein

**In pratica come
misuriamo il redshift?**

Fenditura (slit)

Fenditura (slit)

Spettri

Spettri

Fenditura (slit)

1 arcsec

In funzione del valore del **Raggio di Einstein**, la **dimensione del pixel** (0.252 arcsec/px per il TNG), il **seeing atmosferico** e il **rapporto segnale-rumore**, potremmo avere due casi

Riusciamo a risolvere spettro di lente e sorgente

1

Non riusciamo a risolvere spettro di lente e sorgente

2

Spettro misurato

Lente

Non riusciamo a risolvere spettro di lente e sorgente

2

Spettro misurato

Lente

Queste righe di assorbimento hanno una lunghezza d'onda nel sistema a riposo di ~ 4000 $\text{\AA}$

Non riusciamo a risolvere spettro di lente e sorgente

2

Queste righe di assorbimento hanno una lunghezza d'onda nel sistema a riposo di ~ 4000 $\text{\AA}$

Spettro misurato

Lente

Sorgente

Struttura della proposta

Perché

Domande dalle quali partiamo:
Come si formano le galassie?
Nel nostro caso le più massive che potrebbero essere lenti gravitazionali!

Cosa?

Per esempio, vogliamo caratterizzare le galassie stimando la loro massa totale!

Come?

Usiamo le lenti gravitazionali, che forniscono la stima di massa più precisa nell'Universo

Come?

Per misurare le masse, abbiamo bisogno di sapere le **distanze di lente e sorgente**

Dove?

Al TNG con Dolores

Ott-Dic 2025

Struttura della proposta

I target da osservare devono essere osservabili da nord e nel periodo ott-dic 2025

Osservabilità: <https://astro.ing.iac.es/staralt/index.php>

Survey nel nord:

KiDS@VST (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021ApJ...923...16L/abstract>);

DESI (<https://sites.google.com/usfca.edu/neuralens/publications?authuser=0>);

UNIONS (https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2022/10/aa42505-21/aa42505-21.html)

CFHTLS (<https://academic.oup.com/mnras/article/471/1/167/3868797>)

Euclid

....

**Calcolate con l'*exposure time calculator* i tempi necessari per avere il giusto S/N
(assumendo la magnitudine di lente e sorgente)**

ricordatevi che l'arco o le immagini multiple in genere sono più deboli della lente

Qualche referenza:

Tran+22: <https://arxiv.org/pdf/2205.05307>,

Nagam+24: <https://arxiv.org/pdf/2502.09802>,

Spiniello+19: <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019MNRAS.485.5086S/abstract>,

.....

**Studiate la possibile configurazione di telescopio, spettrografo, range spettrale,
fenditura, fase lunare, seeing, ecc. ecc.**

Gustatevi questa esperienza, indipendentemente dall'esito

**Simulerete il lavoro di un ricercatore
(qualcuno di voi forse intraprenderà questa carriera)**

Esportate questo approccio scientifico anche nella vita quotidiana, per fronteggiare fake news e credulonerie varie

In bocca al lupo!